

HINDI
VERSION

हिन्द

The Self Care Guide for People with Type 2 Diabetes



Servier Laboratories Ltd, Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Slough, SL3 6RJ
Telephone: 01753 662744 Fax: 01753 663456

04DMSCGHINDU234

A SERVICE TO MEDICINE FROM SERVIER LABORATORIES

In association with



The charity for people with diabetes
Registered charity no. 215199
Visit our website www.diabetes.org.uk



A leading partner in diabetes

Diabetes UK has worked with Servier
in producing this educational literature

नाम _____

पता _____

आयु _____

जन्म की तिथि _____

कद _____

ऐलर्जी _____

एन.एस.एस. का नम्बर _____

हस्पताल का नम्बर _____

कन्सल्टन्ट _____

जी.पी. का नाम _____

टैलिफोन नम्बर _____

पता _____

प्रेक्टिस नर्स का नाम _____

हस्पताल

सलाहकार का नाम

पता

.....

.....

टैलिफ़ोन नम्बर

डायबीटिक नर्स विशेषज्ञ

टैलिफ़ोन नम्बर

डिस्ट्रिक्ट नर्स का नाम

टैलिफ़ोन नम्बर

खुराक बनाने वाले (डायटीशन) का नाम

टैलिफ़ोन नम्बर

चिरोपोडिस्ट का नाम

टैलिफ़ोन नम्बर

फ़ार्मासिस्ट का नाम

टैलिफ़ोन नम्बर

- पृष्ठ 7. प्रश्न और उत्तर
- पृष्ठ 24. जानकारी का पता और सम्पर्क के नम्बर
- पृष्ठ 26. खुराक के लिए सलाह
- पृष्ठ 31. घर पर टेस्ट करने के लिए डायरी
- पृष्ठ 46. डायबीटिक (मधुमेह रोग) के इलाज के लिए रिकार्ड

1. डायबिटीज मैलिटीज क्या है?	7
2. मुझे किस प्रकार की डायबिटीज मैलिटीज है?	8
3. "हाईपो" क्या है?	9
4. मैं अपने ग्लूकोज के स्तर का कैसे माप करूँ?	9
5. मैं क्या खा और पी सकता/सकती हूँ?	11
6. क्या मैं शराब पी सकता/सकती हूँ?	12
7. क्या मैं सिगरेट पी सकता/सकती हूँ?	13
8. मुझे अपने पैरों की देखभाल क्यों करनी चाहिए?	14
9. ड्राईविंग के बारे में क्या विचार है?	16
10. यात्रा और हौलिडेज के बारे में क्या विचार हैं?	17
11. स्वास्थ्य निरीक्षण के बारे में मुझे क्या मालूम होना चाहिए?	18
12. दाँतों की देखभाल	18
13. मुफ्त प्रैस्क्रिप्शन	18
14. फैमिली प्लैनिंग के बारे में क्या विचार है?	18
15. क्या मैं खेल सकता/सकती हूँ या कसरत कर सकता/सकती हूँ?	19
16. डायबिटीज में आँखों को क्या होता है?	20
17. मेरे डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर क्यों मापा?	22
18. मुझे अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?	24
19. डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए स्वस्थ खाने	26
20. डायबिटीज के लिए अच्छा खाना – स्वस्थ खाने का आधार	28
21. सही खानों का चयन कैसे किया जाए	30

1. डायबिटीज मैलिटीज क्या है?

डायबिटीज मैलिटीस एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर खून में काफी ग्लूकोज होता है।

आमतौर पर हम एक हार्मोन को पैदा करते हैं जिसे इंसूलीन कहा जाता है (पैंक्रीयाज के ग्लैंड में प्रस्तुत की जाती है) जो ग्लूकोज को जो हम अपने खाने में लेते हैं इसे खून में से ले लिया जाता है और शरीर के द्वारा ताकत के लिए प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज मैलिटीस में, या तो इंसूलीन की कमी होती है या जो इंसूलीन होती है वह सही ढंग से काम नहीं कर रही होती है। बहुत अधिक ग्लूकोज तब खून के बहाव में रहता है और यह कोषाणु द्वारा ताकत के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है।

इसके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- i) शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं मिल पाती है। इसी कारण से कई लोग जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें तब पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है जब वह डॉक्टर के पास जा कर बताते हैं कि वह थके हुए या बीमार महसूस कर रहे हैं।
- ii) खून में कुछ बढ़ा हुआ ग्लूकोज गुर्दों द्वारा खो दिया जाता है जिसके परिणाम से काफी मात्रा में पेशाब का आना, मुँह का सूखना (डीहाईड्रेशन), प्यास लगना और वजन कम होता है।

2. मुझे किस प्रकार की डायबिटीज है?

दो प्रकार की डायबिटीज हैं।

टाईप 1

इस हालत में, पैंक्रियाज पूरी तरह से इंसूलीन पैदा करना बंद कर देते हैं। इस समस्या का कारण अभी तक मालूम नहीं हुआ है और यह आमतौर पर छोटी-सी आयु में होती है (20 वर्ष से कम की आयु में)। क्योंकि शरीर अपने आप कोई इंसूलीन नहीं बना पा रहा है, तो, उन लोगों को जीवन-भर इंसूलीन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं।

टाईप 2

यह हालत उन लोगों में होती मानी जाती है जो 40 वर्ष की आयु से ऊपर हैं (हालाकि कुछ हालतों में और कुछ जन-समूह में है यह छोटी आयु में होती है)। पैंक्रियाज अभी भी इंसूलीन प्रस्तुत करते हैं परन्तु उतनी नहीं कि जितनी शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, या कि जो इंसूलीन यह पैदा करते हैं वह सही ढंग से काम नहीं करती है (इंसूलीन रैजिस्टेंस)।

टाईप 2 की डायबिटीज सभी डायबिटीज के केसों में से 85% है। कई तरीके हैं कि जिन से इनका इलाज किया जा सकता है, और इलाज का चयन कई कारणों पर निर्भर करता है और इसलिए यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है।

- 1) खुराक और कसरत
- 2) खुराक, कसरत और गोलियाँ
- 3) खुराक, कसरत और इंसूलीन के इंजेक्शन।

* यह पुस्तिका टाईप 2 की डायबिटीज पर केन्द्रित है

3. “हाईपो” क्या है?

कुछ गोलियाँ और इंसूलीन के इलाज कभी-कभी खून में ग्लूकोज के स्तर को काफी कम कर देते हैं। यह विशेष रूप से होता है क्योंकि यदि दवाई लेने या इंसूलीन के देने के बाद खाना खाने में देरी हो जाए या शारीरिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से अधिक हैं।

चेतावनी के चिन्ह कि ब्लॉड ग्लूकोज का स्तर बहुत ही कम है:

काँपना, चक्कर आने, पसीना आना, भूख लगनी, अचानक व्यवहार में बदलाव आना (चिड़चिड़ापन)। सिर में दर्द, पीलापन आना। धड़कन या दिल का तेज़ी से धड़कना। आँखों में धुंधलापन। अचानक थकावट होनी। मुँह के आस-पास सनसनाहट होनी।

क्या किया जाए

जल्दी से चीनी खा लें जैसे गक:- चीनी के टुकड़े, ग्लूकोज की गोलियाँ, उबली हुई मिठाई, चौकलेट या चीनी वाले पीने के पदार्थ। एक बार जब निशानियाँ चली जाएँ तो कुछ स्टार्ची (कलफदार) खाना खाएँ, जैसे कि सैंडविच, या आपका अगला खाना यदि उसका समय हो गया हो तो। यह आपको दोबारा हाईपो में जाने से रोकेगा।

“हाईपो” को कैसे रोका जाए

कोशिश करें कि दिन में कोई खाना भूल न जाएँ। हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाने की कोशिश करें (जैसे कि पास्टा, ब्रेड)। यदि आप कसरत करते हों तो, स्नैक खाएँ। हमेशा कोई मीठी चीज़ अपने साथ रखें। अपनी एम्बुलेन्स/हस्पताल की सेवाओं का नम्बर साथ में रखें, ताकि एमरजन्सी में काम आ सके।

4. मैं अपने ग्लूकोज का कैसे माप करूँगा/करूँगी?

पेशाब का टेस्ट

आपका डॉक्टर आपको सलाह कि आपको किस समय पर और कैसे पेशाब को ग्लूकोज के लिए टेस्ट करना है। कन्टेनर (डब्बे या शीशी) पर जो टेस्ट स्ट्रिप लगा है उस पर निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और उन पर अमल करें।

इस किताब के होम टेस्ट डायरी के भाग में अपने पेशाब के टेस्ट का रिकार्ड रखें और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ इसे अपने साथ ले जाएँ।




यदि आपके पेशाब के टैस्ट में ग्लूकोज हो, तो अपने डॉक्टर को बताएँ।

खून के टैस्ट

आपका डॉक्टर आप से कहेगा/कहेगी कि बजाए पेशाब के टैस्ट के उँगली को चुभो कर खून में ग्लूकोज को टैस्ट करें। यह काफ़ी सही होते हैं और कुछ लोग इन्हें काफ़ी सुखदाय महसूस करते हैं। डॉक्टर आपको सलाह देगा कि कब-कब इसे टैस्ट करना चाहिए। फिर से, होम टैस्ट डायरी में एक भाग है जो खून में आपके ग्लूकोज को मापने के परिणामों को रिकार्ड के लिए है।

खून में ग्लूकोज के स्तरों की व्याख्या

4 mmol/L से कम	कम
4 - 10 mmol/L	ठीक है
10 mmol/L से ऊपर	अधिक है



- अपने हाथों को धोएँ, फिर एक बूँद खून की लें
- टैस्ट स्ट्रिप पर रखें
- मीटर (या रंगों के चार्ट)
(अलग-अलग उपकरणों के साथ विवरण भिन्न होता है)

5. मैं क्या खा सकता/सकती हूँ?

विशेष डायबिटीक खाने ज़रूरी नहीं हैं।

जानकारी की पुस्तक में सलाहकारी खुराक देखें।

अधिक जानकारी के लिए
अपने डायटीशन या नर्स से बात करें



6. क्या मैं शराब पी सकता/सकती हूँ?

यदि आप गोलीयाँ या इंसूलीन ले रहे हों तो, शराब पीने से कम ग्लूकोज (हाईपोग्लाइकेमा) हो सकता है। काफ़ी अधिक शराब नहीं पीएँ। जैसा कि सभी के लिए है, शराब को सही मात्रा में पीना चाहिए। यह सिफ़ारिश की जाती है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें सप्ताह में 14 युनिट्स (औरतों के लिए) या 21 युनिट्स (मर्दों के लिए) से अधिक नहीं पीनी चाहिए। एक युनिट बीयर, या लागर के आधे पाइन्ट, एक स्टैन्डर्ड वाइन के ग्लास या एक स्पिरिट्स के स्टैन्डर्ड माप के बराबर है। शराब के साथ या शराब पीने के बाद स्टार्च खाना खाएँ। इसके बाद या अगले दिन खून में ग्लूकोज को टेस्ट करें।

शैरी और स्वीट वाइन्स जैसे पीने वाली वस्तुओं को कुछ सीमा तक ही पीएँ। यदि आपका वज़न अधिक है, तो अपने शराब पीने को कम करें क्योंकि शराब कैलरीज़ में अधिक होती है। 'लो शूगर' बीयर और लागर को मत पीएँ क्योंकि इनमें शराब के कण अधिकतर अधिक होते हैं।

याद रखें


1. शराब में कई कैलरीज़ होती हैं।
2. खाली पेट कभी नहीं पीएँ।
3. यदि शौर्ट्स पी रहे हों तो, स्लिमलाईन मिक्सर्स का प्रयोग करना याद रखें।
4. शराब हाईपो की निशानियों पर पर्दा डाल सकती है।
5. यदि आप बेहोश हैं और शराब की गन्ध आ रही हो, तो लोग हाईपोग्लाइकेमा के लिए चैक नहीं कर सकेंगे।
6. शराब पी कर गाड़ी मत चलाएँ।

7. क्या मैं सिगरेट पी सकता/सकती हूँ?

आपके लिए यह बेहतर है कि आप सिगरेट नहीं पीएँ

सिगरेट पीना सभी के लिए ख़तरनाक है, परन्तु विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जिसे डायबिटीज़।

सिगरेट पीना दिल के दौरों, स्ट्रोक और पैरों में गैंगरीन के ख़तरे को पैदा करता है। इसे छोड़ने में सहायता के लिए अपने डॉक्टर या नर्स से सलाह प्राप्त करें।



8. मुझे अपने पैरों की देखभाल क्यों करनी चाहिए?

आपके पैर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं!

आपको टाईप 2 की डायबिटीज है, परन्तु क्या आपको पता था कि यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पैरों की देखभाल करें?

जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन्हें आमतौर पर पैरों में तकलीफ़ होती है, विशेष रूप से चमड़ी के रोग से, जिसे ठीक होने में समय लग सकता है। कई हालतों में, पैरों की अच्छी देखभाल कर के और अच्छे जूते पहन के इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

स्वस्थ पैरों के लिए टिप्स (भेद देने)

A. अपने पैरों को लगातार चैक करें। (यदि ज़रूरी हो तो एक शीशे का प्रयोग करें)।



नीचे दिए गए चैक करें

- ◆ सूजी हुई या फूली हुई चमड़ी
- ◆ छोटे क्रैक्स या कटे हुए भाग
- ◆ चमड़ी के क्षेत्र जिनका रंग बदल गया हो
- ◆ वह भाग जिन्हें छूने से दर्द होती हो
- ◆ वह क्षेत्र जो आमतौर पर ठंडे या गर्म हों
- ◆ वह क्षेत्र जिनमें दर्द या छूने का महसूस होना कम हो

B. पैरों को हर रोज़ धोएँ

सख्त कैलेंसस (करड़ेपन) को निकालने के लिए प्यूमीस (कुरुन पत्थर) या पैर के ब्रश का प्रयोग मत करें, परन्तु धोने से पहले आप हल्के से एक फुट फ़ाईल का प्रयोग कर सकते हैं और स्टेट रजिस्टर्ड पोडिएट्रिस्ट/शिरोपोडिस्ट की सलाह लें।

- C. सूखे स्थानों पर मौस्चराइज़र (नमी) का प्रयोग करें –** पंजों के बीच डालने को रोकें
- D. अपने नाखूनों को देखभाल कर के ट्रिम (काटना) करें –** पंजे के आकार जैसे उन्हें काटें
- E. नहाने के पानी का तापमान मापें**



अपने पैरों को बहुत गर्म या ठंडे तापमान में या उसके नज़दीक मत रखें (जैसे कि आग के एकदम पास बैठना) या अपने पैरों को बहुत ही गर्म पानी में मत डालें। प्रयोग करने से पहले पानी के तापमान को अपनी कोहनी या बॉथ थर्मोमीटर के साथ चैक करें।

- F. अच्छी तरह से फ़िट आने वाले जूतों को पहनें** कई पैर की समस्याएँ छोटे कटे हुए भाग या घावों से शुरू होती है, जो आमतौर पर ग़लत ढंग से फ़िट किए गए जूतों से होती हैं।



सही फ़िटिंग के जूतों को कैसे चुना जाए

इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके जूते अच्छी तरह से फ़िट हों। जूते ख़रीदने से पहले, यह बेहतर होगा कि आप अपने पैर का माप करा लें। लम्बे समय तक नए जूते मत पहनें, जब तक कि यह सुविधाजनक न हों।

काफ़ी ऊँची एड़ियाँ मत पहनें क्योंकि यह आपके पंजों और पैर के बॉल पर काफ़ी दबाव डाल सकते हैं। जूतों पर एक कसने-ढीला करने वाले तसमां होना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से फ़िट आने में क्षमता हो और गहरी फ़िटिंग हो और जो पंजों के घूम कर जाए। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ट्रेनर्स बेहतर किस्म के जूते हैं।

लगातार अपने जूतों के अन्दर तीखी या खुरदरे स्थानों, छोटे पत्थरों या दूसरी चीज़ों को ढूँढने को महसूस करें, जो आपके पैरों को नुकसान पहुँचा सके। साथ ही में, खुरदरी और मोटी सीन को भी चैक करना।

G. अपने डॉक्टर, डायबिटीज़ की नर्स, पोडिएट्रिस्ट या शिरोपोडिस्ट को मिलें



लगातार पैरों की देखभाल करना ज़रूरी है!

अपने जी.पी. या स्थानीय स्वास्थ्य सेंटर पर शिरोपोडी के बारे में जानकारी के लिए पूछें, जो मुफ्त मिल रही है। यदि आप देखें कि कोई भी पैर की मुश्किल हो, जो पहले लिस्ट की गई थी, तो बिना किसी देर के इन स्वास्थ्य के व्यावसायिकों के साथ बातचीत करें।

9. ड्राइविंग के बारे में क्या विचार हैं?

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो, आपको बताना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है, जब आप एक फ़ार्म भरें।

यदि आप मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, जब आपकी पहली डायबिटीज़ को पहचाना गया तो आपको DVLA को बताना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है।

आपको अपनी इंश्योरंस कम्पनी को भी बताना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है।

अधिक जानकारी के लिए डायबिटीज़ और ड्राइविंग फ़ैक्टशीट की सलाह लें जो डायबिटीज़ यू.के. से उपलब्ध है।



10. यात्रा और हौलिडेज़ के बारे में क्या विचार हैं?

हौलिडे (छुट्टियाँ बिताने देश से बाहर जाना) जाने से काफ़ी पहले अपने स्थानीय डॉक्टर से सम्पर्क करें, ताकि वैक्सिनेशन (टीके लगाने) का प्रबन्ध किया जा सके। मैडिकल इश्योरंस का प्रबन्ध करें, यह सुनिश्चित कर लें कि यह आपकी डायबिटीज़ के लिए है, और एक डायबिटीज़ की पहचान का फ़ार्म साथ ले जाएँ। आपके पूरे हौलिडे पर पर्याप्त दवाईयाँ ले जाएँ, और कुछ अधिक ले जाएँ। अपनी दवाई को अपने हाथ और मुख्य सामान के बीच रखें, सामान के खो जाने की स्थिति में आपके पास दवाईयाँ होंगी। यदि आप इंसूलीन पर हैं और हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो अपने हाथ के सामान में रखें क्योंकि यह हवाई जहाज़ के होल्ड में खराब हो सकती है।



11. स्वास्थ्य के चैक्स के बारे में मुझे क्या जानना जरूरी है?

वर्ष में कम से कम एक बार डायबिटीज के लिए स्वास्थ्य का निरीक्षण करा लेना चाहिए। इसमें शामिल होगा, वजन, ब्लड प्रेशर, दृष्टि (लम्बे समय तक ग्लूकोज का नियंत्रण) कोलेस्ट्रॉल के स्तर, गुर्दा का काम करना, आपकी आँख के पीछे का निरीक्षण करना, आपके पैर और नसें और साथ ही में आपको आपकी डायबिटीज के बारे में बातचीत करने का अवसर मिलेगा। फ़लू के बारे में अपने डॉक्टर से अक्टूबर में बातचीत करें।

वह सारे लोग जिन्हें डायबिटीज है वह मुफ्त फ़लू के वैक्सिनेशन के अधिकारी हैं।

12. दाँतों की देखभाल

अपने दाँतों के डॉक्टर को बताएँ कि आपको डायबिटीज है। लगातार जाँच कराएँ और यदि आपको कोई मुश्किल हो, तो अपने दाँतों के डॉक्टर से जितना शीघ्र हो सके मिलें।

13. मुफ्त प्रैस्क्रिप्शन (दवाईयों के लिए नुस्खा)

यदि आपकी डायबिटीज का गोलियों या इंसूलीन से इलाज होता है, तो आप मुफ्त प्रैस्क्रिप्शन के अधिकारी हैं, परन्तु आपको एक विमुक्ति (ऐंज़ैम्पशन) का सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। इसके लिए कैसे आवेदन किया जाए इसके बारे में अपने डॉक्टर, नर्स या फ़ार्मासिस्ट से बात करें।

14. परिवार नियोजन के बारे में क्या विचार हैं

अपनी डायबिटीज के बारे में अपने डॉक्टर या फ़ैमिली प्लैनिंग क्लिनिक को बताएँ क्योंकि यह आपके गर्भ-अवरोधक (कन्ट्रेसिप्शन) के चयन पर प्रभाव डाल सकता है जो आपको प्रदान किया जा रहा है।

अपने डायबिटीज के विशेषज्ञ के साथ, परिवार शुरू करने के बारे में बातचीत करना एक अच्छा विचार है। गर्भ-धारण (कन्सीव), साथ ही में गर्भावस्था के दौरान यह जरूरी है कि आप अपनी डायबिटीज पर नियंत्रण रखें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सुरक्षित और सफल गर्भ धारण न कर सकें, बशर्ते कि आप डॉक्टर की सलाह पर चलें।

कुछ पुरुष जिन्हें डायबिटीज होती है वह नपुंसकता (बच्चे पैदा न कर पाना) अनुभव करते हैं। कृपया अपने डॉक्टर से बातचीत करें क्योंकि इलाज उपलब्ध है।

15. क्या मैं खेल या व्यायाम कर सकता/सकती हूँ?

निरंतर व्यायाम एक आदर्श तरीका है चुस्त और स्वस्थ रहने का। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज है वह व्यायाम नहीं कर सकता या खेल नहीं सकता, बशर्ते कि उसकी शारीरिक समर्थता ऐसा करने में अनुमति दे। निरंतर व्यायाम दिल के दौरे, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर (ऊँचा खून के दबाव) के खतरे को घटाता है। व्यायाम से आपके खून में ग्लूकोज के स्तरों को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है और इससे दवाई की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे वजन को नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है। सप्ताह में कम से कम तीन बार 20 मिनट के लिए साधारण व्यायाम करने की कोशिश करें (जैसे कि तेज चलना, साईकलिंग और तैरना)। शुरू में हल्का व्यायाम करें और धीरे-धीरे इसे बढ़ाएँ। व्यायाम के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बातचीत कर लें।

याद रखें, कि व्यायाम करने से आपके खून में ग्लूकोज का स्तर कम हो सकता है। व्यायाम करने से पहले और इसके बाद आपको अतिरिक्त खाना खाने की जरूरत हो सकती है।



16. आँख को डायबिटीज़ में क्या होता है?

वह लोग जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी आँख में हानि पहुँचने का खतरा है। 65 वर्ष से कम की आयु के लोगों को नेत्रहीन करने का मुख्य कारण है, और कई हालतों में इसे रोका जा सकता है।

डायबिटीज़ में आँख की बीमारी की निशानियाँ क्या हैं?


आँख का पीछे का भाग जिसे रैटिना कहते हैं उस पर हानि हो सकता है (जिसे रैडिनोपैथी कहते हैं)। आँख के पीछे खून के बहाव में अनियमितता से अच्छी दृष्टि में अभाव का कारण हो सकता है। (जब आपको डायबिटीज़ हो तो रैटिनोपैथी का खतरा होता है, विशेषकर यदि आपका ग्लूकोज़ स्तर अच्छी तरह से नियंत्रण में नहीं है।

कैटरैक्ट्स और ग्लौकोमा भी उन लोगों में आम होता है, जिन्हें डायबिटीज़ है।

आमतौर पर कोई निशानियाँ नहीं होती हैं जब तक कि कोई गम्भीर हानि न पहुँची हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों की जाँच हर साल कराएँ। यदि शीघ्र ही समस्याओं का पता चल जाए, तो इलाज काफ़ी सफल होता है।

कैटरैक्ट्स आपकी दृष्टि पर धुँधलापन पैदा करता है।

यदि आपके खून में ग्लूकोज़ का स्तर आम से ऊँचा है, इससे धुँधलापन आ सकता है। यदि आपकी डायबिटीज़ अस्थिर है, तो तब तक इन्तज़ार करें जब आपका ग्लूकोज़ के स्तर स्थिर हो गए हों, इससे पहले कि आप अपने ऑप्टिशियन से चश्मों के लिए मिलें। अपने डॉक्टर को एकदम बताएँ यदि आप अचानक दृष्टि को खो दें या आपको कोई गम्भीर दृष्टि की समस्या है।



डायबिटीज़ आँख की जाँच कौन करता है?

टैस्ट के लिए औपचलमिक औप्टिशियनस जिनको अतिरिक्त ट्रेनिंग दी गई होती है।

हस्पताल डायबिटीज़ युनिट्स और कुछ जी.पी. की सर्जियाँ डायबिटिक आँख की जाँच, अपने वार्षिक चैक-अप के भाग के रूप में करते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए आँख का निरीक्षण मुफ्त है।

आँख का निरीक्षण कैसे होगा?

आपको आँख के लिए एक चार्ट से पढ़ना होगा, इसलिए यदि आप चश्मे पहनें तो, आप इन्हें अपने साथ रखें।

ओप्टिशियन (आँखों का विशेषज्ञ) आपकी आँखों में ड्राप्स (बूंदें) डालेगा ताकि आपकी पुतली का विस्तार कर सके और उसको आँख के पीछे देखने में सहायता कर सके। ड्राप्स (बूंदें) जलन पैदा कर सकती हैं और आपकी दृष्टि पर असर डाल सकती हैं या आपकी आँखों को रोशनी के सम्बन्ध में कुछ देर के लिए संवेदनशील बना सकती हैं। अपने साथ धूप के चश्मे ले जाएँ और तब तक गाड़ी नहीं चलाएँ जब तक कि असर पूरा नहीं हो गया हो। यदि सम्भव हो, तो किसी को घर ले जाने के लिए कहें।

आँख की बीमारी वाले लोगों का इलाज करना

कई लोग जिन्हें डायबिटिक रैटिनोपैथी (आँख की बीमारी) होती है, उन्हें हल्के-से बदलाव आते हैं और साधारण तौर पर निरंतर निरीक्षण कराना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह खराब नहीं हो रहा है। फिर भी, रैटिनोपैथी के गम्भीर प्रकार हैं, जिसे लेज़र के इलाज की ज़रूरत है ताकि आपकी दृष्टि को और खराब होने से बचाया जा सके।

कैटरैक्ट्स को एक साधारण औपरेशन के द्वारा निकाल दिया जा सकता है।

17. मेरे डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर क्यों मापा?

आपके डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर इसलिए मापा क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों में यह दो गुणा अधिक होता है। डायबिटीज वाले लोग जिन्हें ऊँचा ब्लड प्रेशर है, उन्हें स्ट्रोक या दिल के दौरों का होने का खतरा दो से पाँच गुणा होता है।

डायबिटीज में गुर्दों को हानि (नैफ्रोपैथी) अधिक तेजी से होती यदि आपको ऊँचा ब्लड प्रेशर हो। यदि ऊँचे ब्लड प्रेशर का प्रभावकारी ढंग से इलाज कराया जाए, तो यह इस हानि की गति को कम कर सकता है।

डायबिटीज में आँख को हानि का खतरा है यदि आपको ऊँचा ब्लड प्रेशर है।

आप ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रण करें तो जटिलताओं के खतरे को टाला जा सकता है।

ऊँचे ब्लड प्रेशर का पता कैसे लगाया जाता है?

आपका BP (ब्लड प्रेशर) तब मापा जाएगा जब आप आरामदायक स्थिति में हों। इसे कई समयों यह चेक करने के लिए मापा जाना चाहिए कि क्या आपका BP (ब्लड प्रेशर) निरंतर ऊँचा रहता है। कुछ लोग चिन्ता में होते हैं जब डॉक्टर या नर्स उनका BP (ब्लड प्रेशर) ले रहे होते हैं। इससे बनावटी ऊँचे माप आ सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए, आपके BP (ब्लड प्रेशर) का 24 घंटे के लिए निरीक्षण किया जाएगा, जिससे आपका BP (ब्लड प्रेशर) अपने आप माप लिया जाएगा, जब कि आप अपने घर का आम काम कर रहे होंगे। आपको अपने BP (ब्लड प्रेशर) को वर्ष में कम से कम एक बार, डायबिटीज के लिए चेक कराना चाहिए।

मैं अपने BP (ब्लड प्रेशर) को कैसे सामान्य रख सकने में सहायता कर सकती/सकता हूँ?

- ◆ अपने वजन का ध्यान रखें
- ◆ अपने नमक के सेवन को कम से कम करें
- ◆ लगातार, हल्की कसरत, उदाहरण के रूप में, 20 मिनट की कसरत सप्ताह में कम से कम तीन बार। गतिविधियाँ जैसे कि तेज चलना, तैरना, या साइकल को चलाना अच्छी हैं।

- ◆ अपने शराब के सेवन को एक दिन में 3 युनिट से कम रखें यदि आप पुरुष हैं, या 2 युनिट एक दिन में औरतों के लिए। (एक युनिट = 1 स्पिरिट के सामान्य माप के बराबर है, आधा पाइन्ट बीयर या लागर का, या एक छोटा ग्लास वाइन का)।
- ◆ हर दिन थोड़ा समय आराम के लिए रखें।
- ◆ सिगरेट पीना बन्द कर दें। सिगरेट पीने से दिल का दौरा या स्ट्रोक के खतरे बढ़ते हैं।

दवाई से इलाज

ऊपर दिए गए कदमों के पश्चात यदि आपका ब्लड प्रेशर (ब्लड प्रेशर) ऊँचा है तो, आपका डॉक्टर आपको दवाईयों से इलाज करने के लिए सिफारिश करेगा/करेगी। वह आपके साथ लाघों और सम्भव कुप्रभावों (साइड-ईफैक्ट्स - side effects) के बारे में बातचीत करेगा/करेगी, और आपको टारगेट BP (ब्लड प्रेशर) के मापे जाने के बारे में बताएगा/बताएगी।



18. मैं अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

डायबिटीज यू.के. (पहले ब्रिटिश डायबिटीज एसोसिएशन – British Diabetic Association) जानकारी और समर्थन उन लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रदान करता है जिन्हें डायबिटीज है।

डायबिटीज यू.के. (Diabetes UK) में जितना शीघ्र हो सके शामिल होने का विचार एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह डायबिटीज के सभी विषयों पर जानकारी प्रदान करता है, और इसकी पूरे देश में कई शाखाएँ हैं।

डायबिटीज यू.के. (Diabetes UK) ने हाल ही में अपना कार्यालय नीचे दिए गए नए पते पर बदल दिया है:

डायबिटीज यू.के. सैन्ट्रल ऑफिस **Diabetes UK Central Office**
10 Parkway, London NW1 7AA.
टैलिफोन: 020 7424 1000 फ़ैक्स: 020 7424 1001
ई-मेल: info@diabetes.org.uk
www.diabetes.org.uk

सदस्य नीचे दिए गए प्राप्त करते हैं:

- ◆ महीने में दो बार प्राप्त होने वाली सदस्यों के लिए मैगज़ीन, बैलेंस (**Balance**), जिसमें समाचार और जानकारी होगी।
- ◆ तैयार किए गए कई प्रकाशन जो आपको पूरे और स्वस्थ जीवन के लिए जो जानकारी आपको चाहिए वह उस जानकारी को देते हैं।
- ◆ डायबिटीज के किसी भी विषय के बारे में डायबिटीज यू.के. केरलाइन (Diabetes UK Careline) के साथ गुप्त बात करना (सोमवार से ले कर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से ले कर शाम के 5 बजे तक टैलिफोन 020 7636 6112 पर बात करनी, टैक्सट 020 7462 2757, या ई-मेल इस पते पर करें careline@diabetes.org.uk)।
- ◆ डायबिटीज यू.के. (Diabetes UK) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आपके क्षेत्र में डायबिटीज की सेवाओं को सुधारने में काम करता है।
- ◆ दूसरे लोग, जिनको डायबिटीज है, उनके साथ, एक नेटवर्क (जालदार) स्वैच्छिक समूहों के काम के द्वारा, अपने अनुभवों को बाँटने का अवसर मिलेगा (लगभग पूरे देश में 400)।
- ◆ डायबिटीज यू.के. सेवाओं (Diabetes UK Services') के बीमा और आर्थिक उत्पादन उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं जिन्हें डायबिटीज है।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय (National and Regional Offices)

डायबिटीज यू.के. (Diabetes UK) के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड में छः कार्यालय हैं।

डायबिटीज यू.के. स्कॉटलैंड (Diabetes UK Scotland)

Savoy House, 140 Sauchiehall Street, Glasgow G2 3DH
टैलिफोन: 0141 332 2700
फ़ैक्स: 0141 332 4880
ई-मेल: scotland@diabetes.org.uk

डायबिटीज यू.के. नॉर्थ आयरलैंड (Diabetes UK Northern Ireland)

John Gibson House, 257 Lisburn Road, Belfast BT9 7EN
टैलिफोन: 028 9066 6646
फ़ैक्स: 028 9066 6333
ई-मेल: n.ireland@diabetes.org.uk

डायबिटीज यू.के. कोमरी (Diabetes UK Cymru)

Quebec House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Cardiff CF11 9AB
टैलिफोन: 029 2066 8276
फ़ैक्स: 029 2066 8329
ई-मेल: wales@diabetes.org.uk

डायबिटीज यू.के. नॉर्थ वेस्ट (Diabetes UK North West)

65 Bewsey Street, Warrington WA2 7JQ
टैलिफोन: 01925 653281
फ़ैक्स: 01925 653288
ई-मेल: n.west@diabetes.org.uk

डायबिटीज यू.के. नॉर्थ आयरलैंड और यॉर्कशायर (Diabetes UK Northern and Yorkshire)

Birch House, 80 Eastmount Road, Darlington DL1 1LE
टैलिफोन: 01325 488606
फ़ैक्स: 01325 488816
ई-मेल: north&yorks@diabetes.org.uk

डायबिटीज यू.के. वेस्ट मिडलैंड्स (Diabetes UK West Midlands)

1 Eldon Court, Eldon Street, Walsall WS1 2JP
टैलिफोन: 01922 614500
फ़ैक्स: 01922 646789
ई-मेल: w.midlands@diabetes.org.uk

19. जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए स्वस्थ खाना

डायबिटीज वाले लोगों के लिए वह खाने जो सिफ़ारिश किए जाते हैं वह स्वस्थ खाने की आदत पर आधारित होंगे जिनका मनोरंजन कोई भी ले सकता हो। इसलिए अपने परिवार के लिए अलग से खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाएँगे कि आपको खाना पकाने या तैयार करने के ढंग को बदलना होगा, या जो आप अभी खाना खाते हैं उसके विकल्प में कुछ और खाना होगा।

आपके इलाज में आपकी खाने की खुराक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और स्वस्थ खाना खाने के लिए आपको नीचे दिए गए नियमों का पालन करना होगा:

- ◆ निरंतर रूप से खाना खाएं – सुबह को, दिन में और शाम को और खाना खाने मत भूलें।
- ◆ ऊँचे फ़ाईबर वाला खाना खाएँ जैसे कि होलमील ब्रैड, फल और सब्जियाँ – कम से कम फल और सब्जियों के 5 भाग हर रोज़।
- ◆ पीने के पदार्थ या खानों में मीठा मत मिलाएँ और उन खाने की चीज़ों और पीने के पदार्थों का सेवन मत करें जिनमें काफ़ी मीठा हो।
- ◆ कम तला हुआ और कम चर्बी वाला खाना खाएँ।
- ◆ वह वज़न प्राप्त करें जो आपके लिए स्वस्थ हो।

अतिरिक्त नुस्खे

1. खाना पका होना ज़रूरी नहीं है – एक सैंडविच भी खाना ही है।
2. यदि आपको भूख लगी है तो, होलमील ब्रैड का एक स्लाइस, अधिक आलू या दूसरी सब्जियाँ खाएँ।
3. यदि आपको खाना खाने की बीच में भूख लगे, तो ताज़ा सब्जियाँ या फल या होलमील ब्रैड का एक स्लाइस खाएँ।
4. यदि आपको खाने को तलना हो, तो लार्ड और मक्खन की जगह पर एक स्वस्थ पॉलिअनसैचुरेटेड (polyunsaturated) तेल का प्रयोग करें, जैसे कि सनफ़लावर तेल
5. कोई विशेष डायबिटिक खाने मत ख़रीदें – इनमें चर्बी और मीठा अधिक हो सकता है जो आपके शरीर पर लैग्ज़ेटिव (laxative-जुलाब लगने की दवाई) जैसे प्रभाव डाल सकता है।
6. याद रखें, शराब अतिरिक्त कैलरीज़ देती है।



20. डायबिटीज़ के लिए अच्छा खाना – जो स्वस्थ खाने का आधार हो

खानों को पाँच मुख्य समूहों में बाँटा जा सकता है। हमारे लिए संतुलित खुराक का मनोरंजन लेने के लिए हमें खाना इन समूहों में से खाना चाहिए।


कम से कम 5 सर्विंग फलों और
सब्जियों की हर रोज़।

पतला मीट और मुर्गे, मछली,
बीन्स और वैकल्प ख़रीदें।

चर्बी वाले और मीठे खानों को कम कर दें।

स्टार्ची खानों पर बेस मील्स
और स्नैक्स।

कम चर्बी वाले डैरी (दूध से बने) के खाने।



डायबिटीज़ यू.के. (Diabetes UK) सिफ़ारिश करता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें एक स्टेट रजिस्टर्ड डायटीशन से खुराक के बारे में सलाह मिलनी चाहिए। अपने डॉक्टर या नर्स से विवरण के लिए पूछें।

21. सही खानों का कैसे चयन किया जाना चाहिए

फल और सब्जियों के हर रोज 5 सर्विंग्स का चयन करें। इनमें काफ़ी फ़ाईबर होता है

- ◆ होल फ़रूट
- ◆ बैरीज़
- ◆ अंगूर और स्लाईस किए गए ट्राँपिकल फल
- ◆ कैन (डिब्बों) में बन्द फल
- ◆ फलों का रस या सूखे फल
- ◆ ताज़ा, फ़रोज़न और डिब्बों में बन्द सब्जियाँ
- ◆ सलाद वाली सब्जियाँ

स्टार्ची कार्बोहाईड्रेट्स खानों पर बेस मील

- ◆ ओट्स
- ◆ होल ग्रेन सीरियल्स और ब्रेड
- ◆ पास्टा
- ◆ चावल
- ◆ सभी किस्मों की बीन्स
- ◆ आलू

कम चर्बी वाले डैरी (दूध से बने) खानों का चयन करें

- ◆ सैमी या स्किमड दूध
- ◆ हल्का, डायट या शेष योगर्ट
- ◆ कम चर्बी वाली या कौटेज चीज़
- ◆ डायट फ़्रैमे फ़रे
- ◆ वास्तव में बिना चर्बी के दूध की खीर

उन खानों का चयन करें जिनमें मोनो अनसैच्युरेट्स अधिक हों और चर्बी वाले और मीठे खानों को खाने में कमी करें

- ◆ रेपसीड या औलिव आयल (जैतून का तेल)
- ◆ औलिव-आयल के आधार पर स्प्रेड्स (जैसे कि औलिविया)
- ◆ मूँगफ़लियाँ, हेज़लनट्स, बादाम
- ◆ तेल से भरी मछली, जैसे कि मैकरल, सैलमन या सार्डीन, सप्ताह में कम से कम एक बार

पतला मीट, पोल्टरी (मुर्गा), मछली का चयन करें – बीन्स घुल जाने वाले फ़ाईबर भी प्रदान करता है

नोट करें: यदि आपकी खुराक एशियन है, तो कृपया अपनी नर्स या डायटिशन से स्वस्थ खाना खाने के बारे में जानकारी के बारे में पूछें।

इलाज करने के रिकार्ड का वार्षिक पुनर्विचार

यदि आप अपने पेशाब/खून में ग्लूकोज़ के स्तर को चेक करें तो, आप अपनी डायबिटीज को स्वयं ही समझ सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और यह जानकारी आपके डॉक्टर के लिए लाभदायक होगी, जब आपके इलाज में बदलाव की बात की जा रही हो। ग्लूकोज़ को मापने के कई तरीके हैं। वह तरीका अपनाएँ जिसकी सिफ़ारिश आपके डॉक्टर ने की हो। डॉक्टर या नर्स से पूछें कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। (प्रश्न और उत्तर के भाग को देखें, पृष्ठ 9-10 तक)। घर पर टैस्ट करने की डायरी का प्रयोग करें, जिससे आपके टैस्ट के परिणाम और समयों को रिकार्ड किया जा सके। जब आप डॉक्टर को देखने जाएँ तो साथ में डायरी को ले जाएँ।

दवाई का सेवन

- ◆ इस बात को सुनिश्चित करें कि आप अपनी दवाई को जैसे निर्धारित किया गया है उसे उसी ढंग से लें, चाहे यह आपकी डायबिटीज या ब्लॉड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है।
- ◆ यदि आप अपनी दवाई लेना भूल जाएँ, तो अगली बार इसको दो गुणा मत करें और यदि यह नियमित रूप से हो रहा हो तो अपने डॉक्टर, नर्स या फ़ार्मासिस्ट से बात करें।
- ◆ यदि आप सोचते हैं कि आपको कुप्रभाव (साईड-अफ़ेक्ट्स) होंगे, तो इसके बारे में अपने फ़ार्मासिस्ट के साथ बात करें।
- ◆ यदि दवाईयाँ काऊन्टर से ख़रीद रहे हों, तो फ़ार्मासिस्ट को बताएँ कि आपको डायबिटीज है।

सिंक डे (बीमार वाले दिन) का नियम

- ◆ अपनी दवाई का सेवन करना बन्द मत करें।
- ◆ अपने खून में ग्लूकोज़ के स्तर को दिन में कम से कम 4 बार चेक करें।
- ◆ यदि आपके स्तर काफ़ी ऊँचे हैं या आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो अपने जी.पी. से सलाह के लिए सम्पर्क करें।

लिपिड लैवल्ल्स (चर्बी के स्तर)

- ◆ इन्हें आपके वार्षिक पुनर्विचार के समय पर मापा जाना चाहिए।
- ◆ इन्हें कम करने के लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत है।
- ◆ एक स्वस्थ खुराक और कसरत इनके स्तरों को कम कर सकते हैं।

डायबिटीज़ का इलाज करने का रिकार्ड

अपनी अगली अपाएन्टमेन्ट की तिथि को लिखना मत भूलें

दिप्पणियाँ																				
इलाज																				
दूसरे टेस्ट्स																				
HbA _{1c}																				
खून में																				
BMI																				
वज़न																				
मिलने की तिथि	टारगेट																			